STAHOVANÁ KOJENECKÁ VÝŽIVA: DOPORUČENÝ POSTUP PRO RODIČE

V souvislosti s opakovaným stahováním některých výrobků kojenecké výživy zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví doporučený postup pro rodiče, kteří svým dětem podávali dotčené výrobky.

Přehled opakovaně stahovaných výrobků kojenecké výživy je zveřejněn na webových stránkách Státní zemědělská a potravinářská inspekce a také přímo na webu Ministerstva zdravotnictví Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozorňuje na opětovný výskyt dříve stahované kojenecké výživy Nutrilon v prodejnách Kaufland – Ministerstvo zdravotnictví

Opakované stažení se týká následujících výrobků s dotčeným datem minimální trvanlivosti (DMT):

- **Nutrilon Profutura Duobiotik 1, 800 g – DMT: 10. 3. 2027, 13. 5. 2027 a 5. 11. 2027,**
- **Nutrilon Advanced 2, 800 g – DMT: 16. 9. 2026, 21. 11. 2026 a 20. 12. 2026,**
- **Nutrilon Advanced 2, 1 kg – DMT: 27. 8. 2026, 4. 11. 2026, 24. 12. 2026 a 18. 2. 2027.**

Cereulid je toxin produkovaný některými kmeny bakterie *Bacillus cereus*. Po jeho požití se příznaky objevují obvykle do 8 hodin po konzumaci a nejčastěji se jedná o zažívací obtíže, zejména nevolnost a zvracení. U kojenců je hlavním rizikem rychlá dehydratace.

1. Okamžitě přestaňte podávat danou výživu

- Ověřte, zda se jedná o výrobek uvedený v oznámení o stahování výrobku (odkaz uveden výše).
- Pokud se jedná o dotčený výrobek, výrobek dále nepodávejte, a to ani v případě, že dítě nevykazuje zdravotní obtíže.

2. Uschovejte otevřený i uzavřený výrobek pro případné vyšetření

- Pokud máte k dispozici **neotevřené balení** stahovaného výrobku kojenecké výživy, uschovejte jej v původním obalu. Pro mikrobiologické vyšetření je nutné předložit **neotevřené (originálně uzavřené) balení kojenecké výživy**. Po otevření může dojít k druhotné kontaminaci výrobku mikroorganismy z okolního prostředí, při manipulaci nebo skladování. U otevřeného balení proto již nelze spolehlivě určit, zda případně zjištěné mikroorganismy pocházely z výrobku, nebo se do něj dostaly až po jeho otevření.

  Otevřené balení výrobku může být využito v rámci epidemiologického šetření jako důkazní materiál k ověření možné souvislosti mezi jeho konzumací a zdravotními obtížemi dítěte.

3. Sledujte zdravotní stav dítěte po konzumaci kojenecké výživy

Příznaky se mohou projevit zejména:

- zvracením,
- nevolností,
- průjmem,
- neklidem nebo zvýšenou plačtivostí,
- sníženým příjmem tekutin.

Zvláště kojenci mladší 6 měsíců jsou náchylnější k dehydrataci a poruchám minerálové rovnováhy.

4. Kontaktujte lékaře

Doporučuje se kontaktovat registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, pokud:

- se u dítěte objeví zvracení nebo jiné zažívací obtíže,
- potíže přetrvávají nebo se zhoršují,
- dítě odmítá přijímat tekutiny nebo stravu,
- máte jakékoli pochybnosti o jeho zdravotním stavu.

Lékaři je důležité mimo jiné sdělit popis příznaků a kdy se objevily, informace o množství konzumované výživy a její přesnou identifikaci, údaje o dalším stravování dítěte (kojení, příkrmy).

Neprodleně vyhledejte lékařské ošetření, pokud se objeví:

- opakované nebo silné zvracení,
- známky dehydratace (suché sliznice, vpadlá fontanela, méně močení, výrazná ospalost),
- porucha vědomí,
- celkové zhoršení stavu dítěte.

Hospitalizace bývá někdy nutná právě z důvodu dehydratace.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje rodičům, aby v případě jakýchkoli pochybností neváhali kontaktovat svého registrujícího dětského lékaře. V případě podezření na onemocnění související s konzumací dotčené stahované kojenecké výživy se mohou následně obrátit rovněž na místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, která provede epidemiologické šetření s cílem ověřit možnou souvislost mezi konzumací výrobku a vznikem zdravotních obtíží.